BASF
We create chemistry

Cabrio® WG

Fungicida para el control de enfermedades en peral, olivo, cítricos, caqui y maíz

Composición:
Piraclostrobin 20 % (p/p)

Granulado dispersable en agua (WG)

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n.º ES-00065

Modo de acción según FRAC

GRUPO	11	FUNGICIDA

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA. A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Registrado por:
BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00

Contenido neto: **1 kg**

® = Marca registrada de BASF

81170770 ES 2083

Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador:
Durante la mezcla/carga y aplicación, se utilizarán guantes de protección química, ropa de protección química C1 o tipo 6 y calzado resistente a productos químicos, y en cítricos además utilizará ropa de protección parcial de nivel C3 o tipo delantal tipo PB 3 o PB 4 durante la mezcla/carga.

Seguridad de trabajador:
Durante la reentrada, el trabajador deberá utilizar: ropa de trabajo adecuada o ropa de protección nivel C1 y calzado cerrado.

Normativa aplicable:

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009.
- Ropa de protección C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN14605:2005+A1:2009.
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300g/m^2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m^2).
- Calzado de protección frente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho y otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de protección C1, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN ISO 27065:2017/A1:2019.

Medidas adicionales de mitigación de riesgo:
Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en la aplicación.
Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
Se deberá respetar una banda de seguridad de 10 metros para aplicaciones en olivo, peral y caqui.
No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Se respetará un plazo de reentrada de 17 días en olivo, peral y caqui tras la primera aplicación y de 41 días en caqui tras la segunda aplicación.

Para naranjos, los trabajadores deben usar guantes de protección química durante 4 días después de la cuarta aplicación. De la primera a la tercera aplicación no es necesario el uso de guantes de protección química.

Para el resto de los cítricos, los trabajadores deberán utilizar guantes de protección química durante todo el ciclo del cultivo.

Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m en maíz, 20 m en peral y 10 m en olivo de verdeo, olivo de almazara y caqui hasta las masas de agua superficial.

Para proteger los organismos acuáticos en cítricos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

- 25 m, o
- 15 m en combinación con el uso de boquillas de reducción del 50% de la deriva, o
- 10 m en combinación con el uso de boquillas de reducción del 75% de la deriva, o
- 5 m en combinación con el uso de boquillas de reducción del 90% de la deriva.

SPe8: Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración.

Para proteger los mamíferos silvestres, no aplicar el producto a BBCH < 40 en maíz.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CABRIO® WG es un fungicida formulado como granulado dispersable en agua, que contiene la sustancia activa Piraclostrobin, perteneciente a la familia de las estrobilurinas.

CABRIO® WG es un fungicida de amplio espectro con acción preventiva, curativa, translaminar y con sistemia local que actúa bloqueando la respiración mitocondrial del patógeno. Este fungicida se caracteriza por su rapidez de acción y un efecto duradero.

USOS AUTORIZADOS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Uso	Agente	Dosis (kg/ ha)	N.º Aplicaciones.	Vol. Caldo (L/ha)	P.S.(*) días	Forma y época de aplicación
Pulverización normal con tractor						
Cítricos (excepto naranjo)	*Alternaria* spp.	1,125	1	1500-2000	14	Aplicar a partir del BBCH 31, evitando la floración del cultivo. No aplicar a partir del BBCH 85.
Naranjo	*Alternaria* spp.	1,125	4	1500-2000	14	Durante el periodo de floración (BBCH 53-BBCH 69), solo se podrá realizar una única aplicación. Intervalo entre aplicaciones: 14 días. Aplicar a partir del BBCH 31, evitando la floración del cultivo. No aplicar a partir del BBCH 85.
Maíz	Tizón del maíz (*Helminthosporium turcicum*)	1	1	200-400	No procede	Aplicar durante BBCH 40 – 65.
	Roya (*Puccinia sorghi*)					
Pulverización mecánica y manual						
Caqui	*Mycosphaerella nawae*	0,5	1-2	1000 – 2000	100	(Uso menor por jerarquía) Intervalo entre aplicaciones:15 días. Realizar las aplicaciones desde el desarrollo de las hojas hasta el final de la floración (BBCH 10-69), durante el periodo de la primavera, crítico para la infección. Alternar con otros productos con diferente modo de acción.
Olivo (aceituna de mesa)	Repilo Antracnosis	0,5	1	1000 – 1500	28	Realizar la aplicación durante el periodo de emisión de las hojas nuevas hasta el estadio de inicio de crecimiento de los frutos (abril-junio).(BBCH 15-85)
Olivo (aceituna de aceite)	Repilo Antracnosis	0,5	1	1000 – 1500	105	Realizar la aplicación desde el desarrollo de los brotes hasta que los frutos lleguen al 10% de su tamaño final. (BBCH 15-71)
Peral	Moteado Mancha negra (*Stemphylium*)	0,5	1	1000 – 1500	21	Realizar 1 aplicación desde la aparición del órgano floral (estadio de “oreja de ratón”) hasta la maduración del fruto.(BBCH 54-85)

(*) Recuerde que el plazo de seguridad no reemplaza el momento de aplicación indicado. Ambos son de obligado cumplimiento. El plazo de seguridad garantiza el cumplimiento con el límite máximo de residuos, mientras que el momento de aplicación está relacionado con la eficacia del producto.

Los mejores resultados se obtienen aplicando el producto de forma preventiva, cuando las condiciones ambientales favorecen el establecimiento de la enfermedad, antes de que se observen los primeros síntomas.

MANEJO DE RESISTENCIAS

Alternar **Cabrio® WG**, durante el programa de tratamientos, con otros productos que contengan sustancias activas con diferente modo de acción, para evitar la aparición de resistencias.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. **Almacenar en lugar seco y fresco y bien ventilado.**

BASF
We create chemistry

Cabrio® WG

Fungicida para el control de enfermedades en peral, olivo, cítricos, caqui y maíz

Composición:
Piraclostrobin 20 % (p/p)

Granulado dispersable en agua (WG)

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n.º ES-00065

Modo de acción según FRAC

GRUPO	11	FUNGICIDA

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA. A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Registrado por:
BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00

Contenido neto: **1 kg**

® = Marca registrada de BASF

81170770 ES 2083

Cabrio® WG

Atención

UFI: 59N4-74G8-N00H-M7C0

H332 Nocivo en caso de inhalación.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P261 Evitar respirar la niebla de pulverización.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P391 Recoger el vertido.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:
Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, enjuagarse la boca. No provocar el vómito y no administrar nada por vía oral
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal
- Mareos, debilidad y dolor de cabeza

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Contraindicación: lavado gástrico y carbón activado
- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE
(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases:
Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) SIGFITO.

4 041885 040138

81169000 ES 2063

® = Marca registrada de BASF