

UFI: KUXD-A4H3-3SK6-NFPU

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición o contacto son:

- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
- Dermatitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario

- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE

(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Atención



Mitigación de riesgos medioambientales:

Spe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua superficial.

Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador:

Se utilizará guantes de protección química en operador, para mezcla/carga y/o aplicación como mínima medida de protección individual.

En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación, o en su defecto que la mezcla/carga.

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.

Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

En cucurbitáceas, en pulverización se utilizarán guantes de protección química y ropa de protección química (se corresponde con un equipo de tipo 3 o 4 de acuerdo a la norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009) y calzado adecuado.

En lechuga en campo, en pulverización con tractor se utilizarán guantes de protección química y ropa de protección química (se corresponde con un equipo de tipo 3 o 4 de acuerdo a la norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009) y calzado adecuado.

En lechuga en invernadero, en pulverización manual, se utilizarán guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 (se corresponde con un equipo de tipo 6 de acuerdo a la norma UNE-EN 13034:2005+A1:2009).

Seguridad del trabajador:

En cucurbitáceas, en pulverización, para tareas de más de 2 horas se utilizarán guantes de protección química. El operador no manipulará la instalación del sistema de riego o humectación del suelo durante la aplicación. Se recomienda revisar la instalación del sistema de riego o de humectación del suelo antes del comienzo de la aplicación del producto.

Lávase toda la ropa de protección después de usarla.

Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización, ante de volver a entrar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PROMESS® PLUS es un fungicida sistémico con actividad preventiva para la aplicación en pulverización foliar, humectación del suelo o a través del sistema de riego por goteo. Resulta eficaz en el control de *MILDIU* y en el control de pudriciones de cuello y raíces causadas por *Pythium* y *Phytophthora*.

USOS AUTORIZADOS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Cultivo	Método de aplicación	Patógeno	Dosis	Modo de empleo
Locales y almacenes (Semilleros de hortalizas, suelos de semilleros hortalizas, suelos de semilleros sin planta)	Humectación del suelo de forma preventiva antes de la siembra.	<i>Phytophthora</i> <i>Pythium</i>	5 – 10 ml/m ²	Exclusivamente para suelos de instalaciones de semilleros de hortalizas. Humectación del suelo (mezcla en tanque y aplicación por difusión) de forma preventiva antes de la siembra. 1-2 aplicaciones con un intervalo de 7-10 días. Enjuagar las hojas mojadadas con agua.
Tomate, Pimiento y Berenjena	Aplicación a través del riego por goteo (aplicaciones al aire libre o en invernadero, tanto en suelo natural como sustrato).	<i>Phytophthora</i> <i>Pythium</i>	2 L/ha	Aplicación preventiva en el momento del trasplante o en cualquier otro momento con alto riesgo de infección. Realizar, como máximo, 4 aplicaciones por ciclo de cultivo, a intervalos de 7-15 días. Volumen de caldo: 500 – 1500 L/ha

Calabacín y Pepino Melón y Sandía	Aplicación a través del riego por goteo (aplicaciones al aire libre o en invernadero, tanto en suelo natural como sustrato).	<i>Phytophthora</i> <i>Pythium</i>	2 L/ha	Aplicación preventiva en el momento del trasplante o en cualquier otro momento con alto riesgo de infección. Realizar, como máximo, 4 aplicaciones por ciclo de cultivo, a intervalos de 7-15 días. Volumen de caldo: 500 – 1500 L/ha
	Pulverización foliar (aplicaciones al aire libre, tanto en suelo natural como sustrato).	Mildiu	3 L/ha	Empezar las aplicaciones cuando se observe el primer síntoma de ataque de mildiu, con un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo, y un intervalo de 10 días entre aplicaciones. Volumen de caldo: 300 – 1500 L/ha.
Lechuga	Pulverización foliar (aire libre o invernadero).	Mildiu	1,5 L/ha	Empezar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas del ataque de mildiu, con un máximo de 2 aplicaciones por periodo vegetativo, y un intervalo de 10 días entre aplicaciones. Volumen de caldo: 400 – 1500 L/ha
* Usos Menores: De acuerdo con el artículo 51.5 del Reglamento 1107/2009, el usuario del producto asumirá cualquier fallo de eficacia o falta de selectividad del producto en los cultivos menores autorizados.				
* Brécol	Pulverización foliar (aire libre).	Mildiu	1,15 L/ha	Máximo de 2 aplicaciones (BBCH 20-49), con un intervalo de 10 días entre las mismas. Volumen de caldo: 400 – 1500 L/ha
* Col de Bruselas				Máximo de 2 aplicaciones (BBCH 13-39), con un intervalo de 10 días entre las mismas. Volumen de caldo: 400 – 1500 L/ha
* Coliflor				Máximo de 2 aplicaciones (BBCH 13-51), con un intervalo de 10 días entre las mismas. Volumen de caldo: 400 – 1500 L/ha
* Repollo				Máximo de 2 aplicaciones (BBCH 13-49), con un intervalo de 10 días entre las mismas. Volumen de caldo: 400 – 1500 L/ha

RECOMENDACIONES

PROMESS® PLUS es selectivo sobre una gran variedad de cultivos y con partes comestibles. Debido al amplio abanico de condiciones de cultivo, especies y variedades, se recomienda que se realice una prueba previa sobre algunas plantas antes de realizar el tratamiento sobre toda la parcela a tratar.

La aplicación de caldos de concentración superior al 0,25% puede presentar riesgos de fitotoxicidad en ciertas especies si el tratamiento alcanza las hojas del cultivo. Consultar con el Servicio Técnico de BASF si no se tiene experiencia con la variedad a tratar.

En tratamientos del suelo, se consigue mejorar la distribución y la eficacia de la aplicación si se efectúa sobre el sustrato húmedo. Para obtener una absorción continuada por vía radicular, debe mantenerse el suelo tratado en condiciones normales de humedad.

No aplicar en condiciones de mucho calor, alta insolación, durante los periodos de helada o cuando las plantas estén en condiciones de estrés.

Plazo de seguridad:

Deberán transcurrir entre la aplicación y la recolección al menos 3 días en tomate, pimiento, berenjena, pepino, calabacín, melón y sandía; 7 días en lechuga al aire libre; 14 días en lechuga en invernadero, brécol, coliflor y repollo. No procede en Col de Bruselas y aplicaciones en locales y almacenes (semilleros y suelos de semilleros).

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. **Almacenar en lugar seco y fresco y bien ventilado.**



Promess Plus®

Fungicida sistémico con acción protectora para el control de mildiu y de pudriciones del cuello y raíces causadas por *Pythium* y *Phytophthora*.

Composición:
Propamocarb (como clorhidrato) 60,5% p/v (605 g/l)

Concentrado soluble (SL)

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n.º 21.396

GRUPO	28	FUNGICIDA
-------	----	-----------

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES EN LUGARES NO DESTINADOS AL PÚBLICO EN GENERAL.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Distribuido por:
BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Fabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00

Registrado por:
ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl.
Rue de Renory, 26/1
B-4102 OUGREE (Liege)
BELGICA

Contenido neto:

3 L

® = marca registrada por Arysta LifeScience Benelux SPRL.



81165560 ES 2112