Caramba® EC

El fungicida polivalente para cereales y cultivos de rotación

BASF
We create chemistry

Caramba® EC

El fungicida polivalente para cereales y cultivos de rotación

BASF
We create chemistry

Caramba® EC

Caramba®EC metconazol, es un fungicida de BASF de la clase química de los triazoles con propiedades sistémicas.
Caramba®EC actúa preventivamente ofreciendo protección contra las principales enfermedades de los cereales, leguminosas forrajeras y colza. En colza actúa también como reductor del desarrollo vegetativo

Características

Cultivos: Cereales (Avena, trigo y cebada) leguminosas forrajeras (vezas, titarros,guisantes, habines, etc.), altramuz forrajero,guisante y colza

Composición: Metconazol 9%

Formulación: Concentrado emulsionable, EC

Enfermedades: Cereales (Royas, Septoria, Fusarium de espiga)
Leguminosas forrajerras (Botritis, Roya)
Guisantes (Antracnosis, Botritis, Roya)
Altramuz forrajero (Antracnosis)
Colza (Phoma, Cilindrosporiosis, Oídio, podredumbre del cuello y Tizón

Presentación: 5 litros (4x5 L)

Nº de Registro: 25.781

Beneficios de Caramba® EC

- Es selectivo para el cultivo
- No presenta fitotoxicidad
- Mezcla con facilidad con otros productos
- No presenta problemas con la temperatura
- Se metaboliza rápidamente y no presenta problemas en residuos en cultivos sucesivos

Recomendación de uso

Dosis: 0,8 - 1,0l/h

En leguminosas Caramba® EC se utiliza contra:
Antracnosis: primera aplicación al inicio de floración con repetición al cabo de 3 o 4 semanas.
Botritis: primera aplicación a media floración con repetición al cabo de 3 o 4 semanas.
Roya: primera aplicación al aparecer las primeras excrecencias, con repetición al cabo de 3 o 4 semanas

En cereales, Caramba®EC se aplica a 1l/ha en cultivo totalmente desarrollado.
Si es necesario una aplicación más temprana, reducir la dosis según el desarrollo del cultivo.
En caso de ataque de fusarium de la espiga, aplicar en los estadios de desarrollo 59 - 69.

Eficacia de Caramba® EC



Eficacia en cereales contra Septoria y medida de rendimiento de Caramba® EC versus tebuconazol en trigo.



Eficacia de Caramba® EC sobre Roya en Leguminosas grano Resumn de 3ensayos FNAMS - ARVALIS.



Ensayo en colza, dónde Caramba® EC actúa como reductor del desarrollo vegetativo.



Ensayo de Caramba EC versus tebuconazol y testigo en colza contra phoma