

Tercero[®] Duo

Control flexible y de amplio espectro
de la hoja ancha en cereal.



 **BASF**

We create chemistry

Tercero[®] Duo

1 Control efectivo

y de amplio espectro, de las principales malas hierbas de hoja ancha de los cereales.

4 Tribenuron-methyl y florasulam

Dos materias activas complementarias, que proporcionan un amplio espectro de control.

2 Aplicación flexible

Post-emergencia del cultivo, desde inicio de ahijamiento (BBCH 21) hasta hoja bandera (BBCH 39).

5 Rápida degradación

de las moléculas en el suelo, lo cual facilita la rotación de cultivos.

3 Totalmente selectivo

para el cultivo. Registrado en avena, cebada, centeno, trigo (incluye trigo duro y espelta) y triticale.

6 Formulación optimizada

Gránulo soluble que se disuelve completamente en agua minimizando el riesgo de decantación o de acumulación de sedimentos de producto en la maquinaria de aplicación.



Tercero[®] Duo es un herbicida de post-emergencia diseñado para un control efectivo y de amplio espectro, de las principales malas hierbas de hoja ancha de los cereales.



Formulación a base de dos materias activas líderes europeos en el mercado de los herbicidas de cereal: tribenuron-methyl y florasulam.



Permite una aplicación flexible y es totalmente selectivo para el cultivo. Puede aplicarse desde una postemergencia temprana hasta los estados más avanzados del cereal.



Formulación optimizada

Formulación

Composición: tribenuron-methyl 250 g/kg
+ florasulam 104 g/kg

Formulación: SG (gránulos solubles)

Grupo HRAC: 2+2 (ALS)

Volumen de aplicación: 200 – 400 L/ha

Dosis Tercero[®] Duo



CULTIVOS:

CEREALES DE INVIERNO

- Avena
- Cebada
- Centeno
- Trigo (incluye trigo duro y espelta)
- Triticale

MOMENTO DE APLICACIÓN:

POST-EMERGENCIA DEL CULTIVO:

- Desde inicio de ahijamiento (BBCH 21)
- Hasta hoja bandera (BBCH 39)


Tribenuron. Sulfonilurea

- Rápidamente absorbido por hojas y raíces, traslocándose por xilema y floema.
- Inhibe enzima Acetolactasa sintasa (ALS).
- Las plantas tratadas detienen su crecimiento a las pocas horas de la aplicación y terminan muriendo a los 7-21 días.
- Se degrada rápidamente en el suelo por la flora microbiana.

Florasulam. Triazolpirimidina

- Se absorbe por raíces y hojas y se trasloca rápidamente.
- Inhibe enzima Acetolactasa sintasa (ALS).
- Las plantas tratadas muestran síntomas de clorosis y posterior necrosis en la zona meristemática.
- No es persistente en el suelo.

Soluciones para el cultivo del cereal



Complementos BASF para el control de hoja ancha

PicoMax®. Herbicida residual y de contacto, selectivo para combatir las malas hierbas de hoja ancha en el cultivo de los cereales. Recomendado como herramienta para el manejo de resistencias.

Stomp® Aqua. Control de malas hierbas anuales de hoja ancha y estrecha en pre-emergencia y post-emergencia temprana.

BASF Española S.L.U.
Can Ràbia, 3
08017 Barcelona
Tel. 93 496 40 00
www.agro.basf.es

 **BASF**
We create chemistry

Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Por favor, observe las advertencias, las frases y los símbolos de peligro indicados en ella.